

# ANGIOLEIOMIOMA POLIPOIDE DEL UTERO. REPORTE DE UN CASO Y REVISION DE LA LITERATURA.

Abraham Barón Rojas,  
César Calderón Vidal y  
Carlos M. Ovando  
División Académica de  
Ciencias de la Salud.  
U.J.A.T.

## RESUMEN

El angioleiomioma del útero es una neoplasia muy rara; el desarrollo y las manifestaciones clínicas del presente caso resultaron ser peculiares; la histerectomía en una mujer núbil resultó ser la única opción; el examen histopatológico de la pieza quirúrgica presentó también dificultades. El estado actual de la paciente es bueno.

Palabras clave: angioleiomioma, útero, polipoide, revisión.

## ABSTRACT

Angioleiomyoma is a very low frequency tumor of the uterus; development and clinical manifestations of present case were very peculiar; hysterectomy in a nubil woman was the only option; histopathologic examen of surgical specimen was difficult; actually, patient is in good conditions.

Key words: angioleiomyomas, uterus, polypoid, literature review.

## INTRODUCCION

Los tumores vasculares son bastante comunes en diversas partes del cuerpo; resulta sorprendente no decir lo mismo del útero puesto que el tejido muscular en general y este órgano en particular están ricamente vascularizados (Gompel 1985); asimismo la frecuencia conque el útero es afectado por tumores benignos es de las más altas del organismo (Novak 1967; Persaud 1970) y sin embargo, hasta 1955 sólo se habían reportado 128 casos de tumores vasculares (Bowers 1977); la gran mayoría de ellos son benignos (Greene 1970); las formas vasculares malignas son excesivamente raras (Hertig 1960). Pedowitz reunió hasta 1955, sólo 10 casos (siete hemangiopericitomas malignos y tres hemangiendotelomas) y con ellos hizo su clasificación. Curiosamente casi todas fueron publicadas antes de 1920, debido a la multiplicidad de los nombres aplicados y a la falta de correlación (Pedowitz 1955). Esta casuística se considera la más completa.

De acuerdo a la clasificación de los tumores vasculares del útero, éstos pueden ser de dos tipos: de origen vascular sanguíneo y de origen vascular linfático (Pedowitz op. cit.). Los tumores de origen vascular sanguíneo son los hemangiomas puros, los angiomiomas, hemangiopericitomas y hemangiendotelomas benignos (Harper 1961). El presente trabajo se ocupa de reportar un caso de angiomioma del útero.

Historia clínica del caso: se trata de una paciente núbil del sexo femenino, de 22 años de edad y en buenas condiciones económicas y de higiene. Antecedentes ginecoobstétricos: menarca a los 11 años; ritmo menstrual de 30/3 días; hiperpolimenorrea desde hace 6 años tratada con anticonceptivos orales ciclo-reguladores y progestágenos con pobres resultados. Padecimiento actual: lo inicia hace 10 días con sangrado transvaginal abundante y con coágulos que conducen a la paciente a un cuadro de anemia aguda; se le transfunden 2000 cc de sangre fresca. A la exploración física se identifica